

# CEREJEIRA

## \* NOME CIENTÍFICO

*Amburana cearensis*(Fr.All.) A.C.Smith

## \* FAMÍLIA

Leguminosaea Papilionoideae

## \* NOMES COMERCIAIS

BRASIL: Cerejeira-rajada, amburana, cumaru-do-ceará, cumaré, cumaru-das-caatingas, imburana-de-cheiro, umburana, amburana-de-cheiro, imburana e cumaru-de-cheiro.

## \* ORIGEM

Nordeste do país da caatinga (ES) e (MG) na floresta pluvial do vale do Rio Doce e nos afloramento calcários e matas decíduas dos estados de (MG), (GO), (TO), (MS), (MG) e (SP).Já no sudoeste da floresta amazônica(RO, AC e AM) ocorre a espécie *Amburana acreana* (Ducke) A. C. Smith com características muito semelhantes a essa espécie.

## \* MADEIRA

Moderadamente pesada( densidade 0.60 g/cm<sup>3</sup> ), tronco marrom-avermelhado e o seu corte macio.

## \* CARACTERÍSTICAS GERAIS

Grã direta a irregular e com cheiro de cumarina.

## \* CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura de 4-10 m na caatinga e 10-20 m na mata pluvial e caducifólia, com tronco de 40-80 cm de diâmetro.Folhas compostas, de 10-15 cm de comprimento; folíolos em números de 11-15, com 1-2 cm de comprimento.

## \* TRABALHABILIDADE

É muito boa de se trabalhar.

## \* DURABILIDADE

Moderadamente durável quando exposta às intempérias.

## \* USOS

A madeira é empregada para mobiliário fino, folhas faqueados decorativos, tanoaria, escultura, lambris, balcões e marcenaria em geral.

## \* USOS INTERESSANTES

As sementes possuem odor agradável e era outrora usada para perfumar a roupa.A árvore é muito ornamental, principalmente pelos ramos e tronco que são lisos de cor vinho ou marrom avermelhado.Pode ser empregada com sucesso no paisagismo em geral.